


Що підживляти на
городі в липні від: **Village-Life.biz**



Томати

- на 10 л води аміачної селітри – 10 г,
- суперфосфату та сульфату калію – по 20 г.




Перець

- Під час цвітіння можна підживлювати наступним складом: на 1 м² 7,5 г аміачної селітри, 20 г суперфосфату, 20 г сульфату калію.
- Під час плодоношення – 15, 30 та 30 г/м² відповідно.

Огірки

На 10 л води
нитрофоски – 15 г,
коров'яку – 250 г.



Кабачки та патисони

Вимоги до
живлення кабачків
та патисонів схожі з
огірками.



Кабак

Під час цвітіння підживлюйте
азотно-калійними добривами.
На 10 л води: аміачна селітра –
30 г, сульфат калію – 30 г.

Морква

Підживлюйте повним
мінеральним добривом –
азофоскою або
нитрофоскою по 10-15 г на 1
м².



Часник та цибуля

На початку липня
підживлюйте часник і
цибулю фосфорно-
калійними добривами, що
сприяє дозріванню цибулин



Буряк

На 10 л води:
суперфосфат – 40 г,
хлористий калій – 30 г.

Більше корисної інформації

тут: **Village-Life.biz**

Для культур з коротким періодом вегетації, таких як крп, салат, редис, підживлення не потрібні при правильній підготовці ґрунту.

